


# Observations dans les falaises de Carteret

(Barneville-Carteret - Fr. 50)

SOCIÉTÉ DES SCIENCES DE CHERBOURG



29/03/2012

Pente graveleuse, xérothermique et aérohaline, objet d'un tamisage de végétation rase.



22/09/2012

Haut de plage avec végétation propre aux laisses de mer.



29/03/2012

Pied de falaise, objet d'un tamisage.

**Pied de falaise aérohalin (au tamisage de racines de végétation rase sur sol graveleux-sableux. Cf. photo ci-avant, en bas à dr.).**[0587143 – 5469483 (30) WGS84] – Tamisage : *Armeria maritima*, *Crithmum maritimum*, *Silene* sp, *Plantago coronopus*, graminées, mousses, lichens, etc

- *Cathormiocerus myrmecophilus* (Seidlitz, 1868) 29/03/2012, espèce rarement citée mais fréquente sur le littoral du Cotentin.
- *Cathormiocerus spinosus* (Goeze, 1777) 29/03/2012, espèce peu citée, semblant en limite ouest sur le littoral du Cotentin.
- *Orthochaetes insignis* (Aubé, 1863) 29/03/2012, peu citée, bien que fréquente dans le Cotentin. Signalée sur *Viola*.
- *Philopodon plagiatum* (Schaller, 1783) 29/03/2012, espèce commune sur les sables littoraux, associée à *Ammophila arenaria*.
- *Romualdius angustisetulus* Hansen, 1915 29/03/2012, espèce fréquente dans les sables et falaises du littoral.
- *Sibinia sodalis* Germar, 1824 29/03/2012, se rencontre constamment sur *Armeria maritima*.
- *Trachyploeus rectus* Thomson, 1865 (\*?) 29/03/2012, espèce méridionale jamais encore citée du nord de la France.

**Pente de falaise aérohaline (au tamisage de racines de végétation rase sur sol graveleux-sableux. Cf. photo ci-avant, en haut).**[0586713 – 5469549 (30) WGS84] – Tamisage : *Thymus* sp., *Scilla autumnalis*, *Erodium* sp., *Ulex europaeus*, *Plantago coronopus* + sp., *Euphorbia* sp.

- *Cathormiocerus myrmecophilus* (Seidl., 1868) 29/03/2012, espèce rarement citée mais fréquente sur le littoral du Cotentin.
- *Cathormiocerus spinosus* (Goeze, 1777) 29/03/2012, espèce peu citée, semblant en limite ouest sur le littoral du Cotentin.
- *Romualdius angustisetulus* Hansen, 1915 29/03/2012, espèce fréquente dans les sables et falaises du littoral.
- *Trachyploeus rectus* Thomson, 1865 (\*?) 29/03/2012, espèce méridionale jamais encore citée du nord de la France.

**Autres Coléoptères.**

- *Curimopsis maritima* (Marsham 1802) 29/03/2012, Byrrhidae, plusieurs ex empires au tamisage de falaise (détermination : Rémy Ancellin)

**Estran (sous la végétation des laisses de mer en haut de plage. Cf. photo ci-avant, en bas à gauche).**

[0586481 – 5469851 (30) WGS84]

- *Bothynoderes affinis* (Schrank, 1781) 22/09/2012, espèce assez fréquente sur les estrans du Cotentin, sur Chénopodiacées.

*Bothynoderes affinis* (10)*Cathormiocerus myrmecophilus* (3)*Cathormiocerus spinosus* (2,5)*Orthochaetes insignis* (2,2)*Philopodon plagiatum* (4)*Romualdius angustisetulus* (3)*Trachyploeus rectus* Thomson, 1865 (\*?) (2,5)

Peu citée, cette espèce méridionale se rencontre toute l'année, du bord de mer à 2600 m. d'altitude.

Obtenue lors de tamisages de sols, en divers points des falaises de Carteret où elle semble bien installée.

Sa capture, en nombre, dans les falaises de Carteret est étonnante puisqu'elle n'est citée, pour la France, que du secteur méditerranéen. Elle ne semblerait pas, en effet, remonter vers le Nord au-delà du département de l'Ain (Borovec, 1989).

(\*?) La diagnose et les clés de détermination mènent à *Trachyploeus rectus* Thomson, 1865 mais, du fait de la répartition méridionale de cette espèce, la détermination devra être validée après comparaison avec des exemplaires du sud de la France.