

Haut de plage, dunes, falaises et mares temporaires



Martini des dunes
(*Martelia spodiota*)

DUNES/ COMESTIBLE:
Peux se trouver abondamment
même au bord de la mer.

De Saint-Germain-sur-ty à la Baie des Veys, les dizaines de kilomètres de côtes offrent des paysages remarquables et une biodiversité exceptionnellement riche. Deux milieux naturels dominent dans le nord Cotentin : les vastes étendues dunaires et les falaises.

Sur les falaises, ce sont les landes qui dominent avec les mousses et les bruyères qui offrent un paysage tout à fait unique. Les dunes, bien présentes sur la côte nord-ouest du Cotentin, s'étendent parfois sur plus d'un kilomètre de largeur comme à Bréville ou à Hattenville.

Dans cette région, les falaises sont peu soumises à l'urbanisation et nombreuses sont les sections bien préservées. Les dunes, au contraire, doivent résister aux incursions naturelles de la mer et sont malheureusement soumises à une forte pression humaine. Heureusement, sur la côte ouest, l'acquisition de vastes entités par le Conservatoire du Littoral permet la protection de grandes zones dunaires.

Si peu d'espèces vivent au bord de plage, en raison des conditions très difficiles qui y règnent (vent, eau salée, support instable...), la biodiversité devient exceptionnellement plus ou s'en éloigne. C'est au niveau des pelouses dunaires et des dépressions humides arrière dunaire que la diversité est maximale.

Les falaises possèdent de très riches assemblages de la région de s'installer comme le grand corbeau ou le freux pélicin. Dans les dunes et les dépressions dunaires, ce sont

les plantes et les insectes qui dominent dans quelques espèces rares dans la région : l'éponge pédoncée, la véronique en épi, le chou marin, le grand gravelin, le coucou-hybride ou le cincle-hybride sont quelques unes des espèces régulièrement rencontrées dans ces milieux.

Le Grand corbeau : le roi des falaises

En dehors des oiseaux montagnards français, le grand corbeau (*Corvus corax*) ne fréquente que la Bretagne et la Normandie. Dans cette région, les hauts escarpements sont tous réversés au niveau des falaises du nord Cotentin. Le défragement, la destruction de la source de nourriture et les pièges d'électrification sont autant de risques de disparition de cette espèce emblématique et fascinant bien vite de nos falaises.

Le Cincle-hybride

(*Cinclus hybridus*)

Ce grandin coléoptère affectionne les lieux sablonneux et envahis de ses dunes littorales. Très agile, il court rapidement et s'accroche à la moindre alerte pour se poser quelques mètres plus loin. Insecte vorace, c'est un redoutable prédateur : il s'attaque à tout ce qui bouge.

Si lavez sa tête dans un puits vertical qu'elle creuse dans le sable et saut les proies qui passent à sa portée.

La véronique en épi : un joyau des pelouses dunaires

Espèce montagnarde et semi-montagne, la véronique en épi (*Veronica pinnatifida*) est très rare et protégée dans notre région. Bien présente dans les dunes de Vieuxville et Bréville, elle affectionne particulièrement les pelouses dunaires sèches et rases.

